

Bypass operatie

Resultaten van onze zorg in 2021

Wanneer er **vernaauwing** optreedt in één of meerdere kransslagaders krijgt uw hart te weinig zuurstof. Dit kan resulteren in onder andere pijn op de borst. Om de vernauwing te verhelpen kan een **bypass operatie** worden uitgevoerd. Tijdens de operatie plaatst de hartchirurg een stukje ader of slagader voorbij één of meerdere vernauwingen in uw kransslagader. Zo stroomt het bloed via een alternatieve route en krijgt het hart weer voldoende zuurstof. Een bypass wordt vaak uitgevoerd als medicijnen niet helpen en een dotterbehandeling niet mogelijk is.



722

Operaties
(Hoogste aantal in NL)

Geslacht



82 %

man

18 %

vrouw

Leeftijd



30 %

< 65 jaar

44 %

Tussen 65 - 74 jaar

26 %

> 75 jaar

Complicaties (meetperiode 2017-2021)

Heroperatie
binnen 30 dagen
na de operatie



3,9 %*

Het gemiddelde
van alle hartcentra
in NL is 4,4%.

Diepe ontsteking van het
operatiegebied binnen 30
dagen na de operatie




0,8 %*

Het gemiddelde
van alle hartcentra
in NL is 1,0%.

*Percentages wordt sterk
bepaald door de conditie van de
behandelde patiënten en de
ernst van hun aandoening.

Overleving (2017-2021)

120 dagen na
de operatie
nog in leven



98,4 %*

Het gemiddelde
van alle hartcentra
in NL is 98,2%.

*Percentages wordt sterk
bepaald door de conditie van de
behandelde patiënten en de
ernst van hun aandoening.

Wachttijden

De wachttijd voor een bypass operatie verandert regelmatig. Voor een actuele wachttijd gaat u naar [catharinaziekenhuis.nl/wachttijden](https://www.catharinaziekenhuis.nl/wachttijden)

Polikliniek
Cardiothoracale chirurgie

8,3

Patiënten waarderen het polikliniekbezoek in ons ziekenhuis gemiddeld met een 8,5

Verpleegafdeling
Cardiothoracale Chirurgie

8,8

Patiënten waarderen de ziekenhuisopname in ons ziekenhuis gemiddeld met een 8,7